

AVICHOL®
Vaccin inactivé aluné contre la pasteurellose aviaire

Présentation

En flacon de verre ambré de 50 ml contenant 50 doses de vaccins.

Forme pharmaceutique

Suspension injectable.

Composition par dose

- 5 x 10⁹ germes de *P. multocida*, sérotype A₇ tués
- 5 x 10⁹ souche locale *P. multocida* KA₃ tués
- 5 x 10⁹ souche locale *P. multocida* E₉₇ tués
- Excipients q.s.p. 1 ml.

Indication

Protection des gallinacés et des palmipèdes contre le choléra aviaire.

Contre indications

Ne pas vacciner : les animaux malades, en état de déficience immunitaire,
Et les jeunes de moins de quatre semaines.

Mode d'emploi

- Bien agiter le flacon avant l'emploi.
- Dose : 1 ml. En sous cutanée.
- Age de vaccination : à partir de 4 semaines.
- Rappel : tous les trois (3) mois.
- Ne pas mélanger avec le vaccin PESTAVIA®

Précaution d'emploi

- Différer la vaccination de deux semaines après ou avant une antibiothérapie.
- De mauvaises conditions de conservation ou d'emploi peuvent provoquer une perte d'activité.

Effet secondaire

Parfois, on peut observer un petit nodule au point d'injection qui se résorbe facilement au bout d'une semaine. Pas de complication majeure chez les animaux correctement vaccinés.

Délai d'attente

Au bout de vingt quatre heures (24h).

Conservation

- (6) six mois après la date de fabrication et conserver à +4°C.

USAGE VÉTÉRINAIRE
Autorisation de Mise sur le Marché (A.M.M.) n° 00.201.8.009