

BESOROVAX®

*Vaccin tué aluné contre les clostridioses des ruminants à *Cl. chauvoei* & *Cl. septicum**

Présentation

En flacon de verre ambré contenant 50 doses de vaccin avec capsule perforable.

Forme pharmaceutique

Suspension injectable.

Composition par dose

- au moins $2,6 \times 10^8$ de corps cellulaire inactivés de *C. chauvoei*
- au moins $2,6 \times 10^8$ de corps cellulaire inactivés de *C. septicum*
- 2,5 UI d'anatoxine de *C. Chauvoei* et 2,5 UI d'anatoxine de *C. septicum*
- Excipients q.s.p. 1 ml.

Indication

Immunisation active des bovins et ovins contre le charbon symptomatique et l'œdème malin.

Contre indication

Ne pas vacciner les jeunes animaux de moins de (4) quatre mois (*bovin*) et moins de 2 mois (*ovin*) et les animaux malades et/ou fortement infestés.

Mode d'emploi

- Bien agiter le flacon avant l'emploi.
- Voie d'administration sous cutanée (*de préférence région scapulaire*).
- Dose: 1 ml par animal indépendant de son poids.
- Primo vaccination à partir de 4 mois pour les bovins et de 2 mois pour les ovins, suivie d'un rappel d'injection après 21 à 30 jours.
- Rappel annuel.

Précaution d'emploi

- Une antibiothérapie avant ou après la vaccination peut détruire l'activité du vaccin.
- Ne pas vacciner les jeunes animaux et en déficience immunitaire.

Délai d'attente

- Viande: (48) quarante huit heures.
- Lait : (12) douze heures.

Effet secondaire

Parfois, formation d'un petit nodule sous cutané au point d'injection qui se résorbe facilement au bout d'une semaine.

Conservation

- 1 an à +4°C.
- 3 mois à température ambiante (entre +20°C et +30°C).
- Eviter la lumière et la chaleur excessive (*choc thermique*).
- Ne jamais congeler.

USAGE VETERINAIRE

Autorisation de Mise sur le Marché – A.M.M. n°00.201.8.004