

PESTAVIA®

Vaccin vivant atténué contre la maladie de Newcastle ou la Pseudo- peste aviaire

Forme pharmaceutique

Lyophilisat se présentant en pastille blanche, très hygroscopique en flacon de 8 ml.

Présentation

En flacon de 8 ml contenant un lyophilisat correspondant à 50 doses.

Composition

Chaque dose renferme $10^{4,3}$ DICT₅₀ de virus vaccinal de la maladie de Newcastle (*souche Mukteswar*).

Excipient q.s.p. 1 ml.

Indication

Prévention des espèces aviaires contre la maladie de Newcastle ou la pseudo-peste aviaire.

Contre indications

Ne pas vacciner les jeunes âgés de moins de 3 semaines ainsi que les animaux malades et/ou fortement infestés.

Mode d'emploi, voie d'administration et posologie

Reconstituer le contenu du flacon avec 50 ml d'eau distillée stérile, faire une injection sous cutané (SC) sous l'aile (*membrane de l'aile*) à la dose de 1 ml. Rappel annuel.

Précautions d'emploi

- Ne jamais mélanger avec le vaccin AVICHOL®.
- Le PESTAVIA® peut s'administrer en même temps que l'AVICHOL® mais avec deux seringues différentes et en deux points distincts.
- PESTAVIA® est très labile après reconstitution ; tout flacon reconstitué doit être utilisé dans les 24 heures.
- L'utilisation des seringues et aiguilles stériles est obligatoire pour garantir l'innocuité et l'efficacité du vaccin.

Effet secondaire

Possibilité d'une faible réaction post vaccinale n'excédant pas 1 pour 10 000.

Délai d'attente

Nul, la viande reste propre à la consommation humaine.

Conservation

- Toujours sous froid.
- 1 an à température entre +4°C et +8°C.
- Craint la lumière et toute autre source de chaleur (*éviter choc thermique*).
- Transport sous glace obligatoire.

USAGE VETERINAIRE

Autorisation de Mise sur le Marché – A. M. M. n° 00.201.8.007