

PNEUMOPORC®

Vaccin inactivé contre la Pasteurellose porcine

Forme pharmaceutique

Suspension injectable.

Présentation

En flacon de verre de 20 ml contenant 20 doses de vaccin.

Composition par dose

- au moins 5×10^9 germes de *Pasteurella multocida* (sérotypage A₇ tués)
- 1×10^9 germes de *Pseudomonas aeruginosa* inactivés
- Excipients q.s.p. 1ml.

Indication

Prévention des pneumopathies chez les porcs.

Contre indications

Ne pas utiliser chez les animaux malades et/ou fortement infestés et les jeunes de moins de 45 jours.

Mode d'emploi

- Bien agiter le flacon avant l'emploi.
- Voie sous cutanée (*région scapulaire*).
- Dose : 1 ml par animal, indépendant de son poids.
- Age : à partir de 45 jours.
- Rappel : tous les 3 mois.

Précaution d'emploi

- Différer la vaccination de deux semaines après ou avant la vaccination.
- De mauvaises conditions de conservation ou d'emploi du vaccin peuvent provoquer une perte d'activité.

Effet secondaire

Aucune réaction post-vaccinale.

Délai d'attente

Vingt quatre heures (24h.).

Conservation

- Six (6) mois à température + 4°C.
- A conserver à l'abri de la lumière et la chaleur (*éviter choc thermique*).
- Ne jamais congeler.

USAGE VETERINAIRE

Autorisation de Mise sur le Marché – A.M.M. n° 00.201.8.010