

SOVAXTESCHEN[®]

Vaccin inactivé huileux contre l'encéphalomyélite porcine à Entérovirus ou maladie de Teschen

Forme pharmaceutique

Suspension huileuse injectable.

Présentation

En flacons de 30 ml contenant 20ml de vaccin correspondant à 10 doses.

Composition

Chaque dose renferme $10^{7,4}$ DICT₅₀ de virus de Teschen (*souche Kondratice*) inactivé.

Excipients q.s.p. 2 ml.

Indication

Prévention de l'espèce porcine contre la maladie de Teschen.

Contre indications

- Ne pas vacciner les animaux malades et/ou fortement parasités.
- Ne pas vacciner les jeunes animaux moins de 45 jours d'âge.

Mode d'emploi

- Bien agiter le flacon avant l'emploi.
- Injection en **IM profond au niveau de l'encolure.**
- Dose: 2 fois 2 ml à 15 jours d'intervalle.
- Age de vaccination : à partir de six semaines.
- Rappel tous les 8 mois.

Précaution d'emploi

SOVAXTESCHEN[®] peut s'administrer en même temps que le vaccin RAMJIVAX[®] mais avec deux seringues différentes et en deux points distincts.

Effet secondaire

Aucune réaction post-vaccinale.

NB: les mauvaises conditions d'injection et d'utilisation du vaccin peuvent entraîner localement la formation de nodules.

Délai d'attente

La viande redevient propre à la consommation humaine (48) quarante huit heures après vaccination.

Conservation

- 15 mois à température +4°C.
- Ne jamais congeler.
- Transport sous glace obligatoire.

USAGE VETERINAIRE

Autorisation de Mise sur le Marché – A.M.M. n° 00.201.8.001.