

V A R A V I A®
Vaccin vivant atténué contre la variole aviaire

Forme pharmaceutique

Lyophilisat se présentant en pastille blanche, très hygroscopique.

Présentation

Flacon de 20 ml contenant un lyophilisat correspondant à 50 doses.

Composition

- Chaque dose renferme 10^3 DL₅₀ de virus vaccinal de la variole aviaire (*souche VAR-O*).
- Excipients q.s.p. 0,2 ml.

Indication

Prévention des espèces aviaires contre la variole aviaire.

Contre indications

Ne pas vacciner les jeunes âgés de moins de 5 jours ainsi que les animaux malades et/ou fortement infestés.

Mode d'emploi

- Reconstituer le contenu du flacon avec 20 ml d'eau distillée stérile.
- Faire une seule injection sous cutané (SC) sous l'aile (*membrane de l'aile*).
- Age de vaccination : à partir de 5 jours.
- Dose : 0,2 ml.

Précautions d'emploi

- Ne jamais mélanger avec le vaccin AVICHOL®.
- Le VARAVIA® peut s'administrer en même temps que l'AVICHOL® ou PESTAVIA® mais avec deux seringues différentes et en deux points distincts.
- VARAVIA® est très labile après reconstitution, tout flacon reconstitué doit être utilisé dans les 24 heures.
- L'utilisation des seringues et aiguilles stériles est obligatoire pour garantir l'innocuité et l'efficacité du vaccin.

Effet secondaire

Formation d'une pustule suivie de croûte variolique au point d'injection.

Délai d'attente

La viande reste propre à la consommation humaine.

Conservation

- Toujours sous froid.
- 1 an à température entre +4°C et +8°C.
- Craint la lumière et toute autre source de chaleur (*éviter choc thermique*).
- Transport sous glace obligatoire.

USAGE VETERINAIRE

Autorisation de Mise sur le Marché – A.M.M. n° 00.201.8.008.